

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia w Polsce

WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW HODOWCY DROBIU

**POWINNI ZACHOWYWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
I STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BIOASEKURACJI**

**minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:**

1. **Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni**, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. **Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem**, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. **Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych**, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. **Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne** oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami **umyć ręce** wodą z mydłem;
5. **Stosować maty dezynfekcyjne** w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie
do odpowiednich osób i instytucji**

**(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta)**

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

